Jurnal Ilmiah Kefarmasian

Journal homepage : <http://e-jurnal.stikesalirsyadclp.ac.id>

Pengaruh Konsumsi Tanin Ekstrak Daun Teh Hitam (*Camellia sinensis*) Dosis Bertingkat Terhadap Prevelensi Kejadian Anemia Yang Di Tinjau Dari Level Hemoglobin Dan Hematokrit Pada *Mus musculus balbc Albino*

The Effect Of Consumption Of Black Tea Leaf Extract (*Camellia sinensis*) Dosage Levels On The Prevelence Of Anemia Events At The Review Of Hemoglobin Levels And Hematocrits In *Mus musculus balbc Albino*

Dini Qurrata Ayuni¹, Armaita², Ratna Syafnir³
^{1,2,3}*Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Piala Sakti Pariaman*

e-mail : Ayunidini80@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci :

teh hitam,
anemia, kadar
hemoglobin,
hematocrit, *Mus
musculus balbc
albino*

Keyword :

green technology;
wastewater;
chemistry
laboratory

ABSTRAK / ABSTRACT

Anemia merupakan salah satu masalah kesehatan di Indonesia dengan prevalensi 21,7% (3.068.328 jiwa), Anemia dapat terjadi oleh berbagai faktor seperti faktor nutrisi, salah satu nutrisi yang dapat mengakibatkan anemia adalah kebiasaan minum teh. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh konsumsi tanin ekstrak daun teh hitam (*camellia sinensis*) dosis bertingkat terhadap prevelensi kejadian anemia yang ditinjau dari level Hb dan hematokrit pada *mus musculus balbc albino*. Jenis penelitian ini adalah eksperimental dengan desain penelitian *post test only control group design*. Dengan sampel sebanyak 24 ekor mencit dibagi dalam empat kelompok dengan dosis 0,504 ml, 1,016ml, 1,5ml selama empat belas hari. Darah di ambil melalui ekor mencit, pemeriksaan hemoglobin menggunakan Hb Sahli dan pemeriksaan hematokrit menggunakan centrifuge. Penelitian ini dilakukan di labor anatomi fisiologi dan L2 Dikti. Hasil analisis data menggunakan *one way anova* dan *Uji LSD* dengan derajat kepercayaan 95%. Dari data diketahui terdapat perbedaan rata-rata kadar hemoglobin dan hematocrit tiap kelompok. Rata-rata hemoglobin pada tiap kelompok adalah 11,41, pada kelompok P1: 9,38, P2: 7,65 dan P3: 6,70, sedangkan pada hematocrit kelompok kontrol 53,17, kelompok perlakuan P1: 47,75, P2: 43,91 dan P3: 40,29. Hasil uji dengan menggunakan *one way anova*, didapatkan ada pengaruh pemberian teh hitam terhadap kadar hemoglobin (p value= 0,00) dan hematocrit (p value 0,017). Terdapatnya pengaruh konsumsi tanin ekstrak daun teh hitam (*camellia sinensis*) dosis bertingkat terhadap prevelensi kejadian anemia yang ditinjau dari level Hemoglobin dan hematokrit pada *mus musculus balbc albino*. Disarankan kepada pekonsumsi teh agar lebih memperhatikan dosis teh hitam dengan batas normal 2.7gr/hari, sehingga aman dikonsumsi

Anemia is one of the health problems in Indonesia with a prevalence of

21.7% (3,068,328 people). Anemia can occur by various factors such as nutritional factors, one of the nutrients that anemia can think of is a tea health drink. The purpose of this study was to study the study of the consumption of a multilevel dose of black tea leaf (*camellia sinensis*) extract against the prevalence of anemia in terms of hemoglobin levels and hematocrit in *mus musculus bablc albino*. This type of research is experimental research design with post test only control group design. With a sample of 24 mice divided into four groups at a dose of 0.504 ml, 1.016 ml, 1.5 ml for fourteen days. Blood is drawn through the tail of mice, hemoglobin is examined using Hb Sahli and hematocrit is examined using a centrifuge. This research was conducted in the anatomy physiology laboratory and L2 Dikti. The results of data analysis using one way ANOVA and LSD test with a degree of confidence of 95%. From the data known to contain differences in the average levels of hemoglobin and hematocrit of each group. The average hemoglobin in each group was 11.41, in the groups P1: 9.38, P2: 7.65 and P3: 6.70, while in the hematocrit control group 53.17, the aid group P1: 47.75, P2 : 43.91 and P3: 40.29. Test results using one way ANOVA, obtained the effect of black administration on hemoglobin levels (p value = 0.00) and hematocrit (p value 0.017). There is the effect of consumption of tannins extract of black tea leaves (*camellia sinensis*) multilevel dose on the prevalence of anemia in terms of hemoglobin and hematocrit levels in *mus musculus bablc albino*. It is recommended that tea users pay more attention to the dose of black tea with a normal limit of 2.7gr/day, so it is safe for consumption.

A. PENDAHULUAN

Anemia adalah suatu keadaan tubuh yang ditandai dengan defisiensi pada ukuran dan eritrosit atau konsentrasi hemoglobin dibawah nilai normal (<11 gr%), akibatnya dapat mengganggu kapasitas darah untuk mengangkut oksigen keseluruh tubuh. Anemia secara fungsional didefinisikan sebagai penurunan jumlah masa eritrosit sehingga tidak dapat memenuhi fungsinya untuk membawa oksigen dalam jumlah yang cukup ke jaringan perifer ditunjukkan oleh penurunan kadar Hemoglobin (Hb), Hematokrit (Ht) atau hitungan eritrosit. Anemia bukan penyakit melainkan gejala dari beberapa kondisi termasuk didalamnya kehilangan darah yang berlebih, kerusakan eritrosit atau penurunan produksi eritrosit (Afiyah, 2015).

Prevalensi kejadian anemia didunia masih cukup tinggi berkisaran 40-88%, di Negara Eropa kejadian anemia sekita 49,8%, Amerika Serikat 3.778.654 jiwa, Brazil

2.368.948 jiwa Prancis 777.517 jiwa, di Jerman 1.060.610 jiwa, dan di Polandia 497.030 jiwa, Sedangkan prevalensi anemia di Asia mencapai 58,4%, Anemia di China 16.713.113 jiwa, di india 13.704.953 jiwa, di Pakistan 2. 048.482 jiwa, di Thailand 834.666 jiwa, Singapura 56.024 jiwa dan di Malaysia 302.679 jiwa, angka ini lebih tinggi dari rata-rata di Eropa (TW health O., 2015).

Prevalensi anemia di Indonesia yaitu 21,7% (3.068.328 jiwa) dengan penderita anemia berumur 5-14 tahun sebesar 26,4% dan 18,4% penderita berumur 15-24 tahun, pada remaja wanita sebesar 26,50%, pada wanita usia subur sebesar 26,9%, pada ibu hamil sebesar 40,1% dan pada balita sebesar 47,0% (Kesehatan & Vol, 2016).

Anemia dapat terjadi oleh bebagai faktor seperti faktor nutrisi, salah satu nutrisi yang dapat mengakibatkan anemia adalah teh. Kebiasaan minum teh sudah menjadi budaya bagi penduduk dunia, teh merupakan minuman yang umum dikonsumsi oleh

manusia. Rata-rata konsumsi teh penduduk dunia adalah 120 ml/hari perkapita. Sekitar 76-78% dari teh yang diproduksi dan dikonsumsi adalah teh hitam, 20-22% adalah teh hijau, dan kurang dari 2% adalah teh oolong (Afiyah, 2015).

B. METODE

Jenis penelitian ini adalah eksperimental dengan desain penelitian *post test only control group design* yaitu rancangan yang digunakan untuk mengukur pengaruh perlakuan pada kelompok eksperimen dengan cara membandingkan hasil perlakuan dengan kelompok kontrol di akhir masa perlakuan (Christensen, 2012).

Populasi penelitian ini adalah mencit (*Mus musculus*, L) yang didapat dari unit pemeliharaan hewan percobaan, dengan pertimbangan mencit adalah mamalia coba atau sering disebut hewan laboratorium karena sering dipakai pada penelitian biologi. Pertimbangan lain, bahwa ditinjau dari aspek teoritis dan aspek organobiologi, biokimia hormonal mencit (*Mus musculus*, L) ini mirip dengan mamalia sehingga memudahkan eksplorasi pada penelitian manusia.

Jumlah mencit sebanyak 28 ekor. Untuk kelompok kontrol dan jumlah kelompok perlakuan sama yaitu 7 ekor tiap kandang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis statistik anova tentang rata-rata hemoglobin dan hematokrit dapat terlihat pada tabel 5.1 dan tabel 5.2.

Tabel 5.1 Rata-rata Kadar Hemoglobin pada mencit yang diberikan ekstrak daun teh (n=24)

Kelompok	Rata-rata $\pm$ SD	P
Control	11,41 $\pm$ 0,62	
Perlakuan 1	9,38 $\pm$ 0,44	0,000
Perlakuan 2	7,65 $\pm$ 0,28	
Perlakuan 3	6,70 $\pm$ 0,50	

Dari hasil tabel 5.1 seluruh kelompok diketahui memiliki yang signifikan terhadap kadar hemoglobin dengan *p* value 0,00 atau lebih kecil dari 0.05.

Tabel 5.2 Rata-rata Kadar Hematokrit pada mencit yang diberikan ekstrak daun teh (n=24)

Kelompok	Rata-rata $\pm$ SD	P
Control	53,17 $\pm$ 3,03	
Perlakuan 1	47,75 $\pm$ 3,60	0,000
Perlakuan 2	43,91 $\pm$ 2,89	
Perlakuan 3	40,31 $\pm$ 3,78	

Dari hasil tabel 5.2 seluruh kelompok diketahui kedua variabel yang diteliti memiliki yang signifikansi dengan *p* value 0,00 dengan taraf kepercayaan 95%.

Pengaruh Pemberian Dosis Bertingkat Ekstrak Daun Teh Terhadap Kadar Hemoglobin Dan Hematokrit

Hasil pengujian Anova dilanjutkan menggunakan analisis *post hoc* (LSD) untuk melihat signifikansi masing-masing kelompok. Grafik 6.1 menunjukkan diagram rata-rata kelompok yang memiliki perbedaan signifikan di beri tanda (*).

Grafik 6.1. Rata-rata Kadar Hemoglobin pada mencit yang diberikan ekstrak daun teh

Dari hasil uji lanjutan LSD diketahui terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan. Diketahui bahwa kelompok kontrol memiliki perbedaan dengan kelompok P1 (9,38), P2 (7,65) dan P3 (6,70). Kelompok P1 memiliki perbedaan yang signifikan dengan kelompok P2 dan P3, begitu juga perbedaan pada kelompok P2 dengan P3.

Grafik 5.2 Rata-rata Kadar Hematokrit pada mencit yang diberikan ekstrak daun teh

*= signifikan

Dari hasil uji lanjutan LSD diketahui terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan. Diketahui bahwa kelompok kontrol memiliki perbedaan dengan kelompok P1 (47,75), P2 (43,91) dan P3 (40,29). Kelompok P1 memiliki perbedaan yang signifikan dengan kelompok P2 dan P3, begitu juga perbedaan pada kelompok P2 dengan P3.

Analisis One Way Anova Pengaruh konsumsi tanin ekstrak daun teh (*camellia sinensis*) dosis bertingkat terhadap prevelensi kejadian anemia yang di tinjau dari level Hemoglobin dan Hematokrit pada *mus musculus babc albino*

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata kadar hemoglobin pada setiap perlakuan adalah Kontrol (11,41), P1 (9,38), P2 (7,65) dan P3 (6,70). Sedangkan pada kadar hematocrit pada Kontrol (53,17), P1 (47,75), P2 (43,91) dan P3 (40,29).

Pada uji *One Way Annova* pada tabel 1 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara konsumsi tanin ekstrak daun teh (*camellia sinensis*) dosis

bertingkat terhadap prevelensi kejadian anemia yang di tinjau dari level Hb dan Hematokrit pada *mus musculus babc albino*. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rani (2018) tentang pengaruh pemberian teh hijau terhadap kadar hemoglobin dan hematocrit tikus, didapatkan hasil adanya perbedaan rata-rata kadar hemoglobin dan hematocrit. Rata-rata kelompok kontrol pada kadar hemoglobin adalah 16,39gr% pada kelompok kontrol, P1:13,64gr%, P2:11,19gr% dan P3 10,49gr%, sedangkan pada hematocrit kelompok kontrol 44,83%, kelompok perlakuan, P1:44,38, P2:39,17%, dan P337,17%. Dengan uji anova didapatkan adanya pengaruh pemberian the hijau terhadap kadar hemoglobin (p value = 0,000) dan hematocrit (p value = 0,017).

Penurunan kadar hemoglobin dan hematocrit diketahui karena adanya kemampuan tanin sebagai senyawa antinutrisi karena kemampuannya dalam berikatan terhadap protein dan zat besi yang merupakan komponen utama dalam membentuk hemoglobin. Secara langsung tanin dapat mengakibatkan penurunan kadar hemoglobin dan hematocrit Rani, (2018).

Beberapa teori menyatakan bahwa Daun teh mengandung tanin sebanyak (2-3%). Kandungan tanin inilah yang menjadi masalah utama dari teh. Di dalam minuman teh mengandung kurang lebih 40 mg tannin (Ajisaka, 2012). Tanin dikenal sebagai senyawa antinutrisi karena kemampuannya membentuk ikatan kompleks dengan protein dan zat besi. Kemampuan tanin untuk mengendapkan protein dan zat besi ini disebabkan tanin memiliki sejumlah group fungsional yang dapat membentuk kompleks kuat dengan molekul-molekul protein, oleh karena itu secara umum

tanin dianggap sebagai anti-nutrisi yang merugikan. Ikatan antara tanin dan protein dan zat besi sangat kuat sehingga protein dan zat besi tidak mampu tercerna oleh saluran pencernaan (Mbatha, Downs, & Nsahlai, 2002).

Analisis Post Hoc LSD Pengaruh konsumsi tanin ekstrak daun teh (*camellia sinensis*) dosis bertingkat terhadap prevelensi kejadian anemia yang di tinjau dari level Hemoglobin dan Hematokrit pada *mus musculus bablc albino*

Uji Post Hoc LSD berdasarkan grafik 5.1 dapat dilihat perubahan rata-rata kadar hemoglobin dan hematocrit yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar dosis ekstrak daun teh (*camellia sinensis*) yang diberikan maka jumlah kadar hemoglobin dan hematocrit menurun. Pemberian ekstrak daun teh mulai dari dosis 0,504 ml dapat menurunkan kadar hemoglobin dan hematocrit. Pada saat penambahan dosis P2 :1,01 ml ternyata lebih mempengaruhi kadar hemoglobin dan hematocrit dari pada P1, maka adanya perbedaan yang signifikan antar P1 dan P2. Penambahan dosis pada hewan coba menunjukkan penurunan kadar hemoglobin dan hematocrit, terlihat pada P1, P2 dan P3 terjadinya penurunan.

Menurut (Bährle-Rapp & Bährle-Rapp, 2007) Ikatan kovalen terbentuk apabila tanin telah mengalami oksidasi dan membentuk polimer quinon yang selanjutnya melalui reaksi adisi eliminasi atom N dari gugus asam amino protein menggantikan atom oksigen dari senyawa poliquinon. Ikatan hidrogen yang terbentuk merupakan ikatan antara atom H yang polar dengan atom O baik dari protein (dari asam amino yang memiliki rantai samping non-polar) atau tanin (cincin benzena), adapun yang

mendominasi kekuatan ikatan ini adalah ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik.

D. KESIMPULAN

Adanya pengaruh yang signifikan antara pemberian ekstrak daun teh terhadap penurunan kadar hemoglobin dan hematokrit dengan hasil *p* value 0,00.

PUSTAKA

- Afiyah, R. K. (2015). Konsumsi Teh Mempengaruhi Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Di Wilayah Bps Ny. Nur Isnafiyah Bringin Wetan Taman Sidoarjo. *Jurnal Keperawatan Maternitas, Volume 3*, 143–151.
- Ajisaka. 2012. Teh Khasiatnya Dahsyat. Surabaya: Penerbit Stomata.
- Bährle-Rapp, M., & Bährle-Rapp, M. (2007). *Camelia sinensis*. *Springer Lexikon Kosmetik und Körperpflege*, 86–86. https://doi.org/10.1007/978-3-540-71095-0_1581
- Christense, L. B. 2012. *Experimental Methologi Fourth Edition*. USA: Allyn and Bacon,inc.
- Kesehatan, J., & Vol, R. (2016). *Kementerian kesehatan republik indonesia*. 7(April).
- Mbatha, K. R., Downs, C. T., & Nsahlai, I. V. (2002). The effects of graded levels of dietary tannin on the epithelial tissue of the gastro-intestinal tract and liver and kidney masses of Boer goats. *Animal Science*, 74(3), 579–586. <https://doi.org/10.1017/S1357729800052735>
- Rani, S., Rasyid, R., & Desmawati, D. (2018). High intake of green tea decreased hemoglobin and hematocrit levels in *Rattus novergicus* strain wistar albino. *International Journal of Research in Medical Sciences*, 6(11), 3688.

<https://doi.org/10.18203/2320-6012.ijrms20184431>

TW health O. (2011). The global prevalence of anaemia in 2011. *Who*.