Jurnal Ilmiah Kefarmasian

Journal homepage : <http://e-jurnal.stikesalirsyadclp.ac.id>

GAMBARAN PENGGUNAAN OBAT ANTIHIPERTENSI PADA PASIEN HEMODIALISA DI RAWAT JALAN RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH CILACAP PERIODE OKTOBER-DESEMBER 2018

DESCRIPTION OF THE USE OF ANTI-HYPERTENSIONAL MEDICINE IN HEMODIALYSIS PATIENTS IN HOSPITALS OF THE HOUSE ISLAMIC ILLNESS FATIMAH CILACAP PERIOD OCTOBER-DECEMBER 2018

¹Nuur R. Nikmah, ²Tri Kumala Swandari, ³R.A.AG

^{1,2,3}, Program Studi S1 Farmasi. STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap

e-mail : nikmah.nuur@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci :

Gagal ginjal
kronik,
Hemodialisa,
Penggunaan obat
antihipertensi

Keyword :

Chronic renal
failure,
hemodialysis, use
of
antihypertensive
drugs

ABSTRAK / ABSTRACT

Penyakit Ginjal Kronik (PGK) merupakan masalah kesehatan masyarakat global dengan prevalensi dan insiden gagal ginjal yang meningkat. Penurunan fungsi ginjal mengharuskan pasien menjalani terapi hemodialisa. Pemberian obat antihipertensi sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup pasien hipertensi dengan gangguan gagal ginjal kronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan obat antihipertensi, golongan obat antihipertensi yang digunakan dan golongan obat antihipertensi yang paling banyak digunakan. Populasi penelitian adalah semua pasien hemodialisa yang menggunakan obat antihipertensi. Besar sampel adalah 78 pasien yang dipilih menggunakan teknik *Random Sampling*. Berdasarkan hasil penelitian golongan obat antihipertensi yang digunakan yaitu CCB, ARB, BB, dan Diuretik. Penggunaan obat antihipertensi pada pasien hemodialisa diberikan monoterapi dan kombinasi. Monoterapi pada golongan CCB 8,97%, Diuretik 6,41% dan ARB 1,28%. Terapi kombinasi dari golongan CCB dan Diuretik paling banyak digunakan yaitu sebesar 64,10%, CCB Diuretik dan ARB sebanyak 14,10%, CCB dan ARB sebanyak 3,84%, serta CCB dan BB sebanyak 1,28%.

Chronic Kidney Disease (CKD) is a global public health problem with increased prevalence and incidence of kidney failure. Decreasing kidney function requires patients to undergo

hemodialysis therapy. The administration of antihypertensive drugs greatly influences the quality of life of hypertensive patients with impaired chronic renal failure. This study aims to determine the use of antihypertensive drugs, the class of antihypertensive drugs used and the most widely used class of antihypertensive drugs. The study population was all hemodialysis patients who used antihypertensive drugs. The sample size was 78 patients selected using the Random Sampling technique. Based on the results of research on antihypertensive drug classes used, namely CCB, ARB, BB, and Diuretics. The use of antihypertensive drugs in hemodialysis patients is given monotherapy and combinations. Monotherapy in the CCB group is 8.97%, Diuretic 6.41% and ARB 1.28%. The combination therapy of the CCB and Diuretic groups was the most widely used, which amounted to 64.10%, CCB Diuretics and ARBs of 14.10%, CCB and ARB of 3.84%, and CCB and BB of 1.28%.

A. PENDAHULUAN

Penyakit ginjal kronik (PGK) merupakan masalah kesehatan masyarakat global dengan prevalensi dan insiden gagal ginjal yang meningkat. Sekitar 1 dari 10 populasi global mengalami PGK. Hasil *systematic review* dan meta analisis yang dilakukan oleh Hill et al 2006, mendapatkan prevalensi PGK sebesar 13,4% (KEMENKES RI 2017). Di Indonesia angka kejadian gagal ginjal kronis berdasarkan data RISKESDAS pada tahun 2013, pravalensi gagal ginjal kronis 0,2% dari penduduk Indonesia. Di provinsi Jawa Tengah pravalensi gagal ginjal kronik sebesar 0,3% (RISKESDAS 2013). Penyebab kerusakan ginjal terbanyak yaitu hipertensi dengan persentase 37% ditahun 2014 (PERNEFRI 2014) dan meningkat menjadi 44% pada tahun 2015 (PERNEFRI 2015). Berdasarkan data dari IRR pada tahun 2017 penyakit penyerta pasien gagal ginjal kronik terbanyak adalah penyakit hipertensi dengan persentase 51%. Disamping itu hipertensi juga menjadi penyakit dasar urutan pertama dengan persentase 30% (PERNEFRI 2017). Penurunan fungsi ginjal mengharuskan pasien menjalani terapi hemodialisa. Biasanya pasien melakukan 2-3 kali seminggu selama 3-4 jam per sekali terapi hemodialisa (HD). Proses ini menjadi salah satu pilihan bagi pasien penyakit gagal ginjal. Pemberian obat hipertensi sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup pasien hipertensi dengan gangguan ginjal kronik karena tekanan darah yang terkontrol pada

pasien hipertensi merupakan andalan terapi pada pasien gagal ginjal kronik (KDOQI 2009).

Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap merupakan salah satu rumah sakit swasta yang ada di kota Cilacap. Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan di Instalasi Rekam Medik Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, pada tahun 2016 terdapat jumlah pasien yang melakukan terapi hemodialisa sebanyak 10.004 orang, pada tahun 2017 sebanyak 11.278 orang dan pada tahun 2018 sebanyak 12.568 orang. Terjadi peningkatan jumlah pasien terapi hemodialisa setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan pengamatan mengenai gambaran penggunaan obat antihipertensi pada pasien hemodialisa di Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap periode Oktober-Desember 2018.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian survey analitik dengan pendekatan *case control* yaitu penelitian survey analitik yang mempelajari mengenai factor resiko suatu penyakit dan mengidentifikasi penyebabnya saat ini. Pendekatan waktu yang digunakan yaitu pendekatan *retrospective* yaitu pengumpulan data dari efek atau akibat yang telah terjadi untuk selanjutnya melihat penyebab atau variabel yang mempengaruhi (Notoatmodjo, 2010).

Populasi dalam penelitian ini adalah pasien rawat jalan hemodialisa di Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap periode Oktober-Desember 2018. Sampel dalam penelitian ini diambil secara purposive sampling dengan jumlah sampel 78 pasien. Analisis data yang dilakukan meliputi analisa univariat. Penyajian data dalam bentuk tabel dan disertai narasi.

HASIL

Tabel 1.1 Data Pasien Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi (n=78)	Persentase (%)
Laki-laki	35	44,87
Perempuan	43	55,12

Keterangan : % $\frac{\text{Jumlah pasien pada kategori jenis kelamin}}{\text{Jumlah keseluruhan}}$

Berdasarkan hasil yang terlihat, didapatkan penelitian bahwa jenis kelamin perempuan lebih banyak yaitu 55,12% (43 orang) dibandingkan dengan laki-laki yaitu 44,87% (35 orang).

Tabel 1.2 Data Pasien Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Persentase (%)
18-60	69	88,46%

Berdasarkan tabel 1.2 hasil yang terlihat, diketahui usia pasien hemodialisa didominasi oleh usia 18-60 tahun (88,46%)

dibandingkan dengan usia >60 tahun (11,53%).

Tabel 1.3 Data Pasien Berdasarkan Kunjungan balik selama 1 bulan

Jumlah Kunjungan	Oktober	November	Desember	Frekuensi	Persentase (%)
1	3	1	2	6	7,69
2	2	3	4	9	11,53
3	2	2	4	8	10,25
4	4	4	4	12	15,38
5	10	9	8	27	34,61
6	3	2	4	9	11,53
7	2	5	-	7	8,97

Berdasarkan tabel 1.3 dapat diketahui bahwa kunjungan pasien tiap bulan berbeda terbanyak dengan jumlah kunjungan balik 5 kali dalam sebulan yaitu 27 pasien (34,61%) dan paling sedikit pada jumlah kunjungan 1 kali dalam sebulan yaitu sebanyak 6 pasien (7,69%).

Tabel 1.4 Data Pasien Berdasarkan Kunjungan balik selama periode Oktober-Desember 2018.

Waktu	Frekuensi	Persentase (%)
3 Bulan	24	30,76%
2 Bulan	20	25,64%
1 Bulan	34	43,58%

Tabel 1.4 merupakan gambaran pasien selama periode Oktober-Desember 2018 yang melakukan kunjungan balik terapi HD. Pasien yang melakukan kunjungan balik selama 3 bulan berturut-turut sebanyak 24 pasien (30,76%), kunjungan balik selama 2 bulan sebanyak 20 pasien (25,64%), dan yang melakukan terapi dalam waktu 1 bulan sebanyak 34 orang (43,58%).

Tabel 1.5 Penggunaan Obat Antihipertensi Pada Pasien Hemodialisa Periode Oktober-Desember 2018

Terapi Obat Antihipertensi	Frekuensi (n=78)	Persentase (%)
Monoterapi obat		
CCB	8	10,25
ARB	1	1,28
Diuretik	3	3,84
Kombinasi 2 Obat		
CCB+Diuretik	50	64,10
CCB+ARB	3	3,84
CCB+BB	1	1,28
Kombinasi 3 Obat		
CCB+Diuretik+ARB	12	15,38

Keterangan :

CCB : *Calcium Chanel Blocker*

ARB : *Angiotensin Reseptor Blocker*

BB : *Beta Blocker*

Tabel 1.5 merupakan gambaran penggunaan obat antihipertensi pada pasien hemodialisa, memperlihatkan penggunaan obat dengan 3 jenis terapi yaitu monoterapi obat antihipertensi, kombinasi 2 obat antihipertensi dan kombinasi 3 obat antihipertensi.

PEMBAHASAN

Berdasarkan tabel 1.1, Hal ini sesuai dengan pernyataan Elsanti (2009), bahwa sekitar 60% penderita hipertensi adalah wanita. Hal ini karena sering dikaitkan dengan perubahan hormon estrogen dimana hormon ini memiliki peran dalam meningkatkan kadar HDL kolesterol (*High Density Lipoprotein*) atau kolesterol baik yang menjadi faktor pelindung mencegah terjadinya proses aterosklerosis.

Berdasarkan tabel 1.2, Hal ini sesuai dengan laporan dari *Indonesian Renal Registry* (2015), bahwa terdapat bahwa terdapat 81,64% penderita gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa memiliki rentang 25-60 tahun, dimana pasien dengan rentang usia 45-60 tahun memiliki persentase tertinggi (56,72%). Menurut penelitian Supadmi (2011) menyatakan bahwa usia salah satu resiko gagal ginjal kronik, hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambah usia, semakin berkurang fungsi ginjal.

Tabel 1.4, Penelitian Romian (2016) kunjungan pasien < 12 bulan yaitu 3 dari 5 pasien, sedangkan penelitian ini hanya menggunakan data selama 3 bulan. Jumlah nama yang sama pada periode Oktober-Desember 2018 yaitu 16 pasien.

Tabel 1.5 penggunaan monoterapi obat antihipertensi terbanyak yaitu golongan CCB (*Calcium Chanel Blockers*) sebanyak 8 pasien (10,25%). Menurut penelitian Supadmi (2011) golongan CCB seperti Amlodipine merupakan antihipertensi yang paling umum digunakan pada pasien hipertensi yang mendapatkan hemodialisa, obat ini tidak atau sedikit terdialisis sehingga pada pasien hemodialisa kadar obat dalam darah tetap dan memberikan efek optimal sesuai dengan dosis pemberian.

Penggunaan monoterapi obat antihipertensi berikutnya yaitu golongan ARB (*Angiotensin Receptor Blocker*) sebanyak 1 pasien (1,28%). Pada penelitian Supadmi (2011) golongan ARB merupakan terapi pilihan pada pasien hemodialisa karena pertimbangan berbagai sebab yaitu sifat renoprotektif, mengatasi proteinuria dan efek yang menguntungkan pada pasien yang mengalami gangguan jantung atau gagal jantung kongesif. Golongan ARB merupakan golongan terapi yang direkomendasikan untuk terapi hipertensi pada pasien gagal ginjal kronik karena mekanisme kerjanya yang memblok reseptor angiotensin. Golongan ini memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan golongan penghambat enzim pengubah angiotensin (ACEI) yaitu tidak menyebabkan reaksi anafilaksis dan efek samping berupa batuk. Golongan ini sedikit atau tidak terdialisis sehingga memungkinkan dapat memberikan kontrol tekanan darah yang lebih baik pada pasien yang menjalani hemodialisa (Horl, M.T Horl, W.H 2002).

Penggunaan monoterapi obat dengan golongan diuretik pada penelitian ini sebanyak 3 pasien (3,84%). Golongan diuretic berguna untuk mengatasi udem dan tekanan darah tinggi khususnya pada penderita gangguan ginjal kronik (KDIGO 2012). Menurut penelitian Supadmi (2011) tujuan pemberian furosemid pada pasien hemodialisa adalah untuk mengatur keseimbangan cairan dalam

tubuh, sehingga mengurangi beban jantung memompa aliran darah. Furosemide tidak terdialisis karena tidak mudah larut dalam air sehingga dosis pemberian tidak harus dinaikkan. Pasien yang melakukan hemodialisa sebaiknya mengurangi asupan cairan untuk mencegah terjadinya udem yang meningkatkan beban kerja jantung sehingga tekanan darah meningkat.

Penggunaan kombinasi 2 obat antihipertensi bertujuan untuk mempertahankan tekanan darah yang memiliki tempat aksi dan golongan yang berbeda serta untuk meningkatkan kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat (Skolnik 2000). Pada kelompok terapi kombinasi 2 obat antihipertensi terbanyak yaitu CCB dan diuretik dengan jumlah 50 pasien (64,10%), CCB dan diuretik merupakan obat antihipertensi yang memiliki tempat aksi berbeda, CCB berperan dalam berkerja dengan dalam otot polos pembuluh darah sedangkan diuretic berkerja menghambat kontraseptor K^+ pada edema ginjal (Nafrialdi 2007).

Penggunaan terapi kombinasi 2 obat CCB dan ARB pada penelitian ini sebanyak 3 pasien (3,84%). CCB dan ARB dikombinasikan untuk meningkatkan kerja salah satu obat. Terapi menggunakan CCB dengan pasien gangguan ginjal sangat menguntungkan karena memiliki efek renoprotektif dengan menurunkan resistensi vascular ginjal dan meningkatkan aliran darah ke ginjal tanpa

mengubah LFG dan sedikit di eliminasi pada ginjal (McEvoy 2004), akan tetapi golongan CCB tidak mempunyai efek mengurangi proteinuria (Muti 2012). Sedangkan golongan ARB bersifat renoprotektif yang dapat mengatasi proteinuria dan efek yang menguntungkan pada pasien yang mengalami gangguan jantung (Supadmi 2011).

Penggunaan kombinasi 2 golongan obat antara CCB dan BB paling jarang digunakan yaitu 1 pasien (1,28%). CCB digunakan sebagai pengontrol tekanan darah sedangkan golongan BB pada pasien gagal ginjal disamping untuk mengontrol tekanan darah adalah untuk mengurangi terjadinya resiko infark, jantung koroner, kekurangan kebutuhan O₂ dari jantung, serta untuk menstabilkan kontraktilitas miokard (Munar 2007). Penggunaan BB pada pasien gagal ginjal sebaiknya dihindari karena dapat memperburuk fungsi ginjal dengan penurunan aliran darah ginjal (Nafrialdi 2007) hal ini menyebabkan penggunaan golongan BB sangat rendah.

Tabel 4.5 merupakan gambaran penggunaan obat antihipertensi pada pasien hemodialisa, memperlihatkan penggunaan obat dengan 3 jenis terapi yaitu monoterapi obat antihipertensi, kombinasi 2 obat antihipertensi dan kombinasi 3 obat antihipertensi. Penggunaan monoterapi obat antihipertensi terbanyak yaitu golongan CCB (*Calcium Channel Blockers*) sebanyak 8 pasien

(10,25%). Menurut penelitian Supadmi (2011) golongan CCB seperti Amlodipine merupakan antihipertensi yang paling umum digunakan pada pasien hipertensi yang mendapatkan hemodialisa, obat ini tidak atau sedikit terdialisis sehingga pada pasien hemodialisa kadar obat dalam darah tetap dan memberikan efek optimal sesuai dengan dosis pemberian.

Terapi penggunaan kombinasi 3 obat yang digunakan yaitu CCB, ARB dan diuretik sebanyak 12 pasien (15,38%), dapat dilihat bahwa kombinasi 3 obat ini adalah urutan kedua kombinasi yang sering digunakan setelah kombinasi antara CCB dan diuretik, hasil penelitian lain yang sejalan dilakukan oleh Muti pada tahun 2012 diperoleh hasil yang sesuai jumlah kombinasi 2 obat penggunaannya terbanyak (35,54%) dan kombinasi 3 obat terbanyak kedua (26,64%). CCB dan ARB bekerja dengan meningkatkan kerja salah satu obat kemudian dikombinasikan diuretik untuk mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh, sehingga mengurangi beban jantung memompa aliran darah (Supadmi 2011).

Terapi penggunaan kombinasi 3 obat yang digunakan yaitu CCB, ARB dan diuretik sebanyak 12 pasien (15,38%), dapat dilihat bahwa kombinasi 3 obat ini adalah urutan kedua kombinasi yang sering digunakan setelah kombinasi antara CCB dan diuretik, hasil penelitian lain yang sejalan dilakukan oleh

Muti pada tahun 2012 diperoleh hasil yang sesuai jumlah kombinasi 2 obat penggunaannya terbanyak (35,54%) dan kombinasi 3 obat terbanyak kedua (26,64%). CCB dan ARB bekerja dengan meningkatkan kerja salah satu obat kemudian dikombinasikan diuretik untuk mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh, sehingga mengurangi beban jantung memompa aliran darah (Supadmi 2011).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penggunaan obat antihipertensi pada pasien hemodialisa di rawat jalan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap periode Oktober-Desember 2018 terbanyak digunakan oleh pasien dengan jenis kelamin perempuan (56,41%) dan penggunaan tertinggi pada usia <60 tahun (87,17%). Golongan antihipertensi yang digunakan pada pasien hemodialisa yaitu *Calcium Channel Blocker* (CCB), *Angiotensin Receptor Blocker* (ARB), *Beta Blocker* (BB) dan Diuretik. Penggunaan obat antihipertensi pada pasien hemodialisa diberikan monoterapi dan kombinasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Elsanti, Salma 2009, Panduan Hidup Sehat Bebas Kolesterol, Stroke, Hipertensi & Serangan Jantung, *Araska*, Yogyakarta.
- Horl, M T Horl, W H 2002, Hemodialysis-Associated Hypertension Pathophysiology and Therapy, *Am J Kidney Dis*.
- KDIGO, 2012, *Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney*
- Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI Hipertensi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- KEMENKES RI 2017, *InfoDatin Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI Ginjal*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- McEvoy, GK 2004, *AHFS Drug Information, Amer Soc Health-System Pharmacist*, Betesda.
- Muti, A dan Chasanah U 2012, Evaluasi Rasionalitas Penggunaan Diuretik pada Pasien Gagal Ginjal Kronik yang Dirawat Inap di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, *Fakultas Ilmu Kesehatan UMM*, Malang.
- Nafrialdi, Setiawan 2007, *Farmakologi dan Terapi Edisi 5*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- PERMENKES RI, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit*, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- PERNEFRI, 2014, *7th Report of Indonesian Renal Registry*, Perkumpulan Nefrologi Indonesia, Jakarta.
- PERNEFRI, 2015, *8th Report Of Indonesian Renal Registry*, Perkumpulan Nefrologi Indonesia, Jakarta.
- PERNEFRI, 2017, *10th Report of Indonesian Renal Registry*, Perkumpulan Nefrologi Indonesia, Jakarta.

RISKESDAS, 2013, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Supadmi, Woro 2011, Evaluasi Penggunaan Obat Antihipertensi Pada Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik Yang Menjalani Hemodialisa, *Fakultas Farmasi UAD*, Yogyakarta.