Jurnal Ilmiah Kefarmasian

Journal homepage : <http://e-jurnal.stikesalirsyadclp.ac.id/index.php/jp>

GAMBARAN BIAYA DAN TERAPI INSULIN DIABETES MELITUS TIPE 2 PADA PASIEN BPJS DI POLI RAWAT INAP RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH CILACAP PERIODE JANUARI – DESEMBER 2018

DESCRIPTION OF COSTS AND THERAPY INSULIN DIABETES MELITUS TYPE 2 IN BPJS PATIENTS IN POLICY IN HOSPITAL ISLAMIC HOSPITAL FATIMAH CILACAP PERIOD JANUARY - DECEMBER 2018

Ikhwan Dwi Wahyu Nugroho¹, Septiana Indratmoko², Dwiapriyani³

¹ Program Studi D3 Farmasi. STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap

² Cilacap, Indonesia

e-mail : ikhwandwiwahyunugroho@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci :

Insulin, diabetes mellitus, biaya

Keyword :

Insulin, diabetes mellitus, cost

ABSTRAK / ABSTRACT

Diabetes Melitus merupakan salah satu sindrom kelainan metabolik yang memiliki karakteristik yaitu hiperglikemik dan merupakan salah satu penyakit kronik yang cukup banyak diderita oleh masyarakat. Penyakit tersebut merupakan jenis penyakit kronik yang membutuhkan biaya terapi yang besar. Penelitian ini menggunakan metode *cross sectional* secara retrospektif terhadap data rekam medis pasien dan data biaya terapi insulin. Rata-rata biaya terapi insulin yang digunakan oleh 100 pasien BPJS DM tipe 2 dengan penyakit penyerta di rawat inap di Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap selama periode januari – Desember 2018 adalah Rp 172.622,-. Insulin dengan harga satuan tertinggi hanya digunakan oleh 1 pasien yaitu *Humalog mix* dengan harga Rp 231.000,-, sedangkan insulin dengan harga terendah digunakan pasien yaitu *Novorapid flexpen* dengan harga Rp 110.100,-. Penggunaan terapi insulin terbanyak adalah insulin tunggal *Novomix flexpen*, yaitu sebanyak 36 pasien (36 %).

Diabetes mellitus is a syndrome of metabolic disorders that has the characteristics of hyperglycemia and is one of the chronic diseases that is suffered by many people. The disease is a type of chronic disease that requires large therapeutic costs. This study used a cross sectional method retrospectively to patient medical record data and insulin therapy cost data. The average cost of insulin therapy used by 100 BPJS DM type 2 patients with concomitant diseases treated at the Fatimah Islamic Hospital Cilacap during the January-December 2018 period was Rp 172,622, -. Insulin with the highest unit price is only used by 1 patient namely Humalog mix with a price of Rp 231,000, while insulin with the lowest price is used by a patient namely Novorapid flexpen at a price of Rp 110,100. The most common use of insulin therapy is Novomix flexpen insulin, as many as 36 patients (36%).

A. PENDAHULUAN

DM menjadi masalah utama kesehatan terutama di Negara berkembang termasuk Indonesia dikarenakan tingkat morbiditas dan mortalitasnya yang tinggi (Laurentia, *et al.*, 2014).

Penyakit diabetes ada pada urutan ke empat dari penyakit kronis di Indonesia (Maulana, 2012). Penyakit Diabetes Melitus (DM) tipe 2 merupakan jenis penyakit kronik yang membutuhkan biaya terapi yang besar. Pada tahun 2012, biaya medis yang dihabiskan untuk terapi pasien DM tipe 2 di Amerika Serikat mencapai 245 milyar dollar. Pasien dengan diagnosa DM tipe 2 menghabiskan biaya medis 2,3 kali lebih besar dibandingkan pasien dengan diagnosa DM tipe 1. Sekitar 71,84% biaya medis yang dikeluarkan oleh pasien DM tipe 2 digunakan untuk biaya medis langsung yang berkaitan dengan terapi, termasuk di dalamnya adalah penyediaan obat – obatan antidiabetes (Fitri, dkk., 2015).

Berdasarkan analisis biaya kesakitan (*Cost of Illness/COI*) selama 6 bulan, diperoleh biaya terapi insulin sebesar Rp3.966.381,51 dan biaya terapi kombinasi insulin-metformin sebesar Rp.2.598.991,69. Penggunaan terapi kombinasi insulin-metformin memiliki biaya kesakitan lebih rendah dibandingkan terapi insulin pada pasien DM tipe 2 (Sholih, dkk., 2018).

Data Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap tahun 2017 didapatkan angka kejadian kasus *Non Insuline Dependent Diabetes Militus (NIDDM)* sebanyak 4,491 kasus, sedangkan tipe *Insuline Dependent Diabetes Militus (IDDM)* sebanyak 335 kasus. Hasil Riskesda 2007 menyatakan bahwa Pada Propinsi Jawa Tengah, jumlah kasus DM tertinggi adalah di Kabupaten Cilacap (3,9%), diikuti Kabupaten Tegal Kota (3,1%), Surakarta (2,8%), dan Pemalang (2,1%) (Riskesda, 2007).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan memiliki program khusus untuk penyakit DM tipe 2 yaitu Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS) (Idris, 2014). Salah satu upaya untuk memberikan

pelayanan yang efisien dan efektif dalam pengelolaan pasien diabetes ini adalah dengan melakukan analisis pola pengelompokan komponen biaya pasien diabetes pasien rawat inap, agar dapat dilakukan pendeteksian adanya *over treatment* atau pemborosan dalam pemberian terapi (Hai-yan YU, *et al.*, 2009).

Berdasarkan latar belakang di atas, Cilacap merupakan wilayah dengan kasus DM tertinggi di Jawa Tengah yaitu sebesar 3,9%, disisi lain biaya insulin termasuk dalam kategori biaya yang mahal. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai biaya dan terapi insulin DM tipe 2 pada pasien BPJS sehingga dapat mendukung pemilihan terapi yang efektif dan efisien.

B. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *cross - sectional* dengan pengambilan data yang dilakukan secara retrospektif terhadap data rekam medis dan data biaya terapi insulin Diabetes Melitus (DM) tipe 2 pada pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan penyaki penyerta di poli rawat inap Rumah Sakit Islam Fatimah Kabupaten Cilacap.

Populasi yang digunakan seluruh pasien BPJS DM tipe 2 di poli rawat inap Rumah Sakit Islam Fatimah Kabupaten Cilacap periode Januari – Desember 2018. Sampel pada penelitian ini seluruh pasien BPJS DM tipe 2 di poli rawat inap Rumah Sakit Islam Fatimah Kabupaten Cilacap periode Januari – Desember 2018 yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji analisis biaya terapi insulin Diabetes Melitus (DM) Tipe 2 pada pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(BPJS) di poli rawat inap Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap periode Januari – Desember 2018. Didapatkan total populasi sebanyak 233 pasien BPJS DM tipe 2. Sampel yang diperoleh sebanyak 100 pasien yang memenuhi kriteria inklusi, 15 pasien meninggal, dan 118 pasien tidak memenuhi kriteria inklusi. Pengambilan data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari bagian Instalasi Farmasi dan bagian rekam medis yang terdapat dalam sistem komputer serta melihat rincian penggunaan jenis merk insulin dari instalasi farmasi pasien BPJS DM Tipe 2 rawat inap yang selanjutnya akan uji statistik secara deskriptif.

Tabel 1. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Responden	
		N	%
1	Laki-laki	49	49.0
2	Perempuan	51	51.0
Total		100	100

Berdasarkan Tabel 1, jumlah pasien DM tipe 2 lebih banyak diderita oleh perempuan yaitu sejumlah 51 orang dengan presentase 51 % dibandingkan dengan laki-laki yaitu sejumlah 49 orang dengan presentase 49 %. Hal ini sesuai dengan pernyataan Taylor (2010), yang menyatakan bahwa penyebab utama banyaknya perempuan terkena diabetes tipe 2 karena terjadinya penurunan hormon estrogen terutama saat masa menopause. Hormon estrogen dan progesteron memiliki kemampuan untuk meningkatkan respons insulin di dalam darah. Pada saat masa menopause terjadi, maka respons akan insulin menurun akibat hormon estrogen dan progesteron yang rendah (Taylor, 2010).

Tabel 2. Karakteristik Berdasarkan Usia

No	Jenis kelamin	Responden	
		N	%
1	17 – 25 th	1	1.0
2	26 – 35 th	1	1.0

3	36 – 45 th	3	3.0
4	46 – 55 th	38	38.0
5	56 - 65 th	33	33.0
6	Lebih 65 thn	24	24.0
Total		100	100

Berdasarkan Tabel 2, terlihat adanya peningkatan jumlah pasien DM tipe 2 paling banyak ada pada kelompok usia 46 tahun sampai dengan 55 tahun, kemudian mengalami penurunan pada kelompok usia berikutnya. Hal ini sesuai dengan hasil riset pusat data dan informasi, dimana angka kejadian dari diabetes mellitus tipe 2 meningkat seiring dengan peningkatan usia (PP RI, 2015).

Tabel 3. Jenis Merk Insulin tunggal dan kombinasi yang digunakan Pasien

Jenis Merk Insulin	Jumlah Pasien	(%)
1. <i>Novorapid Flexpen</i>	17	17.0 %
2. <i>Humalog 25 quickpen</i>	1	1.0 %
3. <i>Levemir flexpen</i>	6	6.0 %
4. <i>Novomix flexpen</i>	36	36.0 %
5. <i>Novorapid Flexpen + Novomix flexpen</i>	12	12.0 %
6. <i>Novorapid flexpen + Levemir flexpen</i>	23	23.0 %
7. <i>Novorapid flexpen+ Humalog quickpen</i>	1	1.0 %
8. <i>Novomix flexpen + Levemir flexpen</i>	2	2.0 %
9. <i>Humalog mix 25 + Humalog 25 quickpen</i>	1	1.0 %
10. <i>Novorapid flexpen + Levemir flexpen + Novomix flexpen</i>	1	1.0 %
Total	100	100 %

Berdasarkan Tabel 3, penggunaan jenis insulin yang digunakan berbeda-beda berdasarkan keadaan fisiologis pasien. Penggunaan jenis insulin di Rumah Sakit Islam Fatimah ada 5 jenis insulin yaitu *Humalog Mix 25*, *humalog 25 quickpen*, *Levemir flexpen*, *Novomix flexpen*, dan *Novorapid flexpen*. Semua jenis insulin ini termasuk insulin analog. Insulin analog merupakan upaya untuk membuat insulin yang menyerupai profil insulin yang fisiologis normal ditubuh kita. Berdasarkan tabel di atas penggunaan insulin terbanyak adalah insulin tunggal *Novomix flexpen*, yaitu sebanyak 36 pasien (36 %).

Novomix flexpen yaitu insulin kerja pendek yang diberikan kepada pasien DM yang mengandung insulin *aspart* kerja pendek sebesar 30% dan *protamine* insulin *aspart* kerja menengah 70%. Insulin ini berefek sekitar 10-20 menit setelah injeksi. Sama seperti semua insulin durasi aksinya tergantung pada dosis, tempat injeksi, aliran darah, suhu dan aktivitas pasien, biasanya maksimum efek akan berlangsung antara 1-4 jam setelah injeksi, dan efek berakhir sekitar 24 jam (Daeng, 2014).

Pemilihan tipe insulin tergantung pada beberapa faktor yaitu respon tubuh individu terhadap insulin, pilihan gaya hidup, berapa banyak suntikan perhari yang ingin dilakukan, berapa sering melakukan pengecekan kadar gula darah, usia dan target pengaturan gula darah (Cerika, 2010). Harga jenis insulin yang digunakan pada terapi Pasien BPJS DM Tipe 2 Rawat Inap Di RSIF Cilacap Selama Januari - Desember 2018 tertera pada tabel di lampiran.

Berdasarkan lampiran rata-rata biaya insulin yang dikeluarkan Pasien BPJS DM Tipe 2 Rawat Inap Di RSIF Cilacap Selama Januari - Desember 2018 adalah sebesar Rp 172.622,00.

Terdapat 5 macam obat yang diberikan yaitu *Novorapid flexpen*, *Novomix flexpen*, *Levemir flexpen*, *Humalog mix* dan *Humalog mix quikpen*. Berdasarkan hasil penelitian terdapat jenis insulin dengan harga satuan tertinggi namun penggunaannya sedikit yang tertera pada tabel tersebut yaitu *humalog mix* dengan harga Rp 231,000.00 penggunaan hanya 1 kali pada pasien. Sedangkan insulin dengan harga terendah digunakan sebanyak 31 kali pada pasien yaitu *Novorapid flexpen* dengan harga Rp 110,100.00.

Pada hakekatnya pengobatan Diabetes Melitus bertujuan untuk menurunkan kadar gula darah baik puasa maupun setelah makan. Dalam rangka mencapai sasaran pengobatan yang baik maka diperlukan terapi pemberian obat yang baik (Cerika, 2010).

KESIMPULAN

Gambaran biaya dan terapi insulin DM tipe 2 pada pasien BPJS selama periode Januari – Desember 2018 yaitu Rata-rata biaya terapi insulin yang digunakan oleh 100 pasien BPJS DM tipe 2 dengan penyakit penyerta di rawat inap di Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap selama periode Januari – Desember 2018 adalah Rp 172.622,-. Insulin dengan harga satuan tertinggi hanya digunakan oleh 1 pasien yaitu *Humalog mix* dengan harga Rp 231.000,-, sedangkan insulin dengan harga terendah digunakan pasien yaitu *Novorapid flexpen* dengan harga Rp 110.100,-. Penggunaan terapi insulin terbanyak adalah insulin tunggal *Novomix flexpen*, yaitu sebanyak 36 pasien (36 %).

PUSTAKA

- Baroroh Faridah, Wahyu Yulianan Solikah, Qarry 'Aina Urfiyya., 2016., *Analisis Biaya Terapi Diabetes Melitus Tipe 2 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta.*, Universitas Ahmad Dahlan: Yogyakarta
- Dinkes Jawa Tengah., 2017., *Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.*, Semarang: Dinas Kesehatan Provil Jawa Tengah.
- Fitri, E., Andayani., T.M., Suparniati E., 2015., *Analisis Biaya Penyakit Diabetes Mellitus.*, JMPF., 2015;5(1):61-66.
- Hai-yan YU., Jing-song LI., Xiong HAN., et al., 2009., *Data Mining Analysis of Inpatient Fees in Hospital Information System.*, IEEE Int. Symp: IT Med. Educ. 2009. 2009;1:8285. doi:10.1109/ITIME.2009.5236458.
- Idris, Fachmi., 2014., *Pengintegrasian Program Preventif Penyakit Diabetes Melitus Tipe 2 PT Askes (Persero) ke Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).*, Artikel Penelitian.
- Kirkman MS, Briscoe VJ, Clark N, et al. Diabetes in older adults. *Diabetes Care.* 2012;35(12):2650-2664. doi:10.2337/dc12-1801.
- Larasanty, Luh Putu Febryana., I Gusti Ngurah Agung Dewantara Putra., Made Ary Sarasmita., 2017., *Total Biaya Terapi*

- Insulin Pada Kasus Diabetes Mellitus Tipe 2 Rawat Jalan Di Kotamadya Denpasar.*, Bali: Jurusan Farmasi, Fakultas MIPA, Universitas Udayana, Bali.
- Laurentia, M., Uken S., Sidartawan S., 2014., 'Prevalence and Clinical Profile of Diabetes Mellitus in Productive Aged Urban Indonesians', J Diabetes Invest, Vol. 5, pp. 507–512.
- Maulana, M., 2012., *Mengenal Diabetes Melitus Panduan Praktis Menangani Penyakit Kencing Manis.*, Jogjakarta: Kata Hati.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.*; 2015.
- Prabawati, R.K. 2012. *Mekanisme Seluler dan Molekuler Resistensi Insulin*. Artikel Ilmiah.Tersedia di: <http://aulanni.lecture.ub.ac.id/>
- Restada, E.J. 2016. *Hubungan Lama Menderita dan Komplikasi Diabetes Melitus dengan Kualitas Hidup Pada Penderita Diabetes Melitus di Wilayah Puskesmas Gatak Sukoharjo*. Skripsi. FIK UMS. Tersedia di: eprints.ums.ac.id/45383/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf [Sitasi 11 Juni 2017].
- Riskesda., 2007., *Laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) 2007*.
- Rismayanthi Cerika., 2010., *Terapi Insulin Sebagai Alternatif Pengobatan Bagi Penderita Diabetes Mellitus.*, Yogyakarta: Medikora
- Sholih, M. G., Ahmad Muhtadi., Siti Saidah., 2018., *Analisis Cost of Illness Terapi Insulin dan Kombinasi Insulin-Metformin pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di Salah Satu Rumah Sakit di Bandung.*, Bandung: Jurnal Farmasi Klinik Indonesia, Maret 2018. Vol. 7 No. 1, hlm 10–18. ISSN: 2252–6218.
- Singal Grasela, Mario E. Katuuk, Yolanda B. Bataha., 2017., *Hubungan Pengetahuan tentang Terapi Insulin dengan Inisiasi Insulin pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di Rumah Sakit Pancaran Kasih Gmim Manado.*, Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Tamara, E., Bayhakki,, Fathra, A.N. 2014. *Hubungan antara Dukungan Keluarga dan Kualitas Hidup Pasien Diabetes Mellitus Tipe II di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau*. JOM PSIK. Vol. 1 No. 2. 22 Juni 2017. Tersedia di TNR.
- Taylor, C., Lillis, C., Lemone, P., & Lynn, P. 2010. *Fundamental of nursing: The Art and Science of Nursing Care (7th)*. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.